

## NOTE XXIII.

DESCRIPTION D'UNE NOUVELLE ESPÈCE DE  
GYRINIDE DU MUSÉE DE LEYDE

PAR

**M. REGIMBART.***Orectogyrus Polli*, nov. spec.

Long.  $6\frac{3}{4}$  mm. (ano excepto). — *Oblongo-ovalis*, *elongatus*, *mediocriter convexus*; *supra in regionibus glabris purpureo-cupreus*, *nitidus*, *subtilissime reticulatus*, *in regionibus punctato-tomentosis obscure ceruleus et subopacus*, *anguste pallide testaceo limbatus*; *infra pallide testaceus*, *pedibus concoloribus*. *Pronoto utrinque late tomentoso*. *Elytris spatio communi glabro, subparallelo, sat lato, paulo post medium desinente et postice a sutura in duobus lobis longe diviso; truncatura obliqua, sinuata, angulo externo subacuto, interno recto*. ♂ *tibiis anticis rectis, sat latis, triangularibus, angulo externo late rotundato et deleto; tarso sat dilatato, parallelo, tibia paulo brevior*. — ♀ *ignota*.

Forme oblongue ovale, très-allongée, à peine atténuée aux deux bouts, mais non parallèle, convexité très-médiocre, bien nette dans le sens transversal, presque nulle longitudinalement; dessus du corps couvert sur les régions glabres d'une réticulation très-fine, à mailles rondes sur la tête et le pronotum, à mailles un peu allongées transversalement et un peu obliquement sur les élytres, d'un cuivreux rougeâtre ou pourpré sur ces régions, d'un bleu foncé d'acier

Notes from the Leyden Museum, Vol. VI.

et presque mat sur les parties tomenteuses; dessous et pattes roux clair. Bordure tomenteuse du pronotum large, occupant environ un quart de chaque côté, oblique comme les bords et à peine plus large en avant. Ecusson tellement court et petit qu'il disparaît entièrement sous le bord postérieur du pronotum, pour peu que celui-ci soit dans l'extension. Espace glabre des élytres occupant presque la moitié interne de chacune à la base, commun dans le premier cinquième de leur longueur, puis divisé par la suture en deux prolongements allongés et atténués régulièrement jusqu'à leur sommet qui dépasse un peu le milieu de chaque élytre; cette atténuation se fait aux dépens des bords internes, les deux externes étant presque parallèles et la portion tomenteuse suturale qui divise ces prolongements ayant la forme d'un coin allongé; la troncature est oblique, largement sinuée en dehors, à peine visiblement en dedans, les angles non émoussés, l'externe subaigu, l'interne droit. Chez le mâle le tibia antérieur est assez large, triangulaire, avec l'angle externe très-arrondi et effacé, le tarse assez dilaté, parallèle et un peu plus court que le tibia.

Cette espèce, dont je n'ai vu qu'un seul mâle qui a été offert au Musée de Leyde par M. J. R. H. Neervoort van de Poll (à qui je dédie l'espèce), vient du Transvaal; dans mon « Essai monographique sur les Gyridés », elle devra se placer entre les *Orectogyrus Oberthüri* et *longipes* et prendre par conséquent le n<sup>o</sup>. 265 bis.

Evreux, Avril 1884.